

neo-angin®

KADULJA

pastile bez šećera

2,4-diklorbenzilni alkohol
amilmetakrezol
levomentol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmete ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3-4 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što su neo-angin® kadulja pastile bez šećera i za što se koriste?
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati neo-angin® kadulja pastile bez šećera?
3. Kako uzimati neo-angin® kadulja pastile bez šećera?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati neo-angin® kadulja pastile bez šećera?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su neo-angin® kadulja pastile bez šećera i za što se koriste?

neo-angin® kadulja pastile bez šećera su antiseptik i blagi analgetik za usta i ždrijelo čije se djelovanje temelji na kombinaciji 2,4-diklorbenzalnog alkohola, amilmetakrezola i levomentola.

Lijek je namijenjen za kratkotrajno potporno liječenje upale sluznice ždrijela praćene tipičnim simptomima poput grlobolje, crvenila ili otokline.

neo-angin® pastile bez šećera su namijene za primjenu u odraslih, adolescenata i djece starije od 6 godina.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3-4 dana.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati neo-angin® kadulja pastile bez šećera?

Nemojte uzimati neo-angin® kadulja pastile bez šećera

- ako ste alergični na djelatne ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).
- ukoliko imate astmu i druge bolesti dišnih puteva s

- osjetljivošću dišnih puteva kod kojih može doći do bronhokonstrikcije zbog ulja paprene metvice i mentola.
- lijek se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 6 godina.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete neo-angin® kadulja pastile bez šećera u slučaju prethodnog dugotrajnog kašljanja, iskašljavanja ili promuklosti. Kod ustrajnih simptoma, porasta temperature ili pogoršanja općeg stanja, potrebno se odmah posavjetovati s liječnikom jer će stanje možda biti potrebno liječiti s drugim lijekovima.

Ako imate žgaravicu ili hijatalnu herniju, ponekad može doći do pogoršanja ovih simptoma nakon uzimanja ulja paprene metvice te je u tom slučaju potrebno prekinuti primjenu ovog lijeka.

Djeca

neo-angin® kadulja pastile bez šećera se ne smiju primjenjivati u djece mlađe od 6 godina.

Drugi lijekovi i neo-angin® kadulja pastile bez šećera

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Interakcije s drugim lijekovima nisu poznate.

neo-angin® kadulja pastile bez šećera s hranom i pićem

neo-angin® pastile bez šećera nemojte uzimati neposredno prije i tijekom obroka ili uzimanja tekućine.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Dostupnih kliničkih podataka o primjeni neo-angin® kadulja pastila bez šećera u trudnoći nema ili su vrlo ograničeni. Ispitivanja na životinjama ne pokazuju da neo-angin® kadulja pastile bez šećera izravno ili neizravno štetno djeluju na trudnoću, razvoj ploda, porod ili razvoj djeteta.

Zbog nedovoljne količine informacija, nije moguće u potpunosti isključiti rizike za plod, stoga se ne preporučuje primjena ovog lijeka tijekom trudnoće ili dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Utjecaj ovog lijeka na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima nije vjerojatan.

neo-angin® kadulja pastile bez šećera sadrži pomoćne tvari

Lijek sadrži boju Ponceau 4R (E124) koja može uzrokovati alergijske reakcije.

Jedna neo-angin® kadulja pastila bez šećera sadrži 2,58 g izomalta koji je zamjena za šećer što odgovara otprilike 6 kcal (26 kJ). Izomalt može imati blagi laksativni učinak. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.





3. Kako uzimati neo-angin® kadulja pastile bez šećera?
Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

Odrasli i djeca starija od 6 godina trebaju polako otopiti jednu pastilu u ustima svaka 2-3 sata. Maksimalna dnevna doza je 6 pastila.

Ako Vam se simptomi pogoršaju ili ne nastupi poboljšanje u roku od 3-4 dana, javite se liječniku.

Primjena u djece

Lijek se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 6 godina.

Ako uzmete više neo-angin® kadulja pastila bez šećera nego što ste trebali

Nema prijavljenih slučajeva predoziranja.

U slučaju predoziranja, koje je vrlo malo vjerojatno, nuspojave opisane u dijelu 4. mogu se javiti u intenzivnijem obliku te se preporučuje javiti svom liječniku koji će provesti simptomatsko liječenje.

Ako ste zaboravili uzeti neo-angin® kadulja pastile bez šećera

Ako ste zaboravili uzeti neo-angin® kadulja pastile bez šećera ili ste uzeli manje nego što je potrebno, nastavite ih uzimati u skladu s uputama.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom neo-angin® kadulja pastila bez šećera obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave nuspojave, iako se one neće javiti kod svakog.

Moguće nuspojave i njihova učestalost:

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba): nadražnost sluznice usta i želuca.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka): mogu se javiti alergijske reakcije poput oticanja usta i jezika.

Dotatne nuspojave u djece

Ulje paprene metvice može uzrokovati grč grkljana (laringospazam) u dojenčadi i djece do 2 godine starosti.

Prijavlivanje nuspojave

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojave:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Odsjek za farmakovigilanciju

Ksaverska cesta 4

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Fax: + 385 (0)1 4884 110

Website: www.halmed.hr

e-mail: nuspojave@halmed.hr

Prijavlivanjem nuspojave možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati neo-angin® kadulja pastile bez šećera? neo-angin® kadulja pastile bez šećera trebate čuvati Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvati na temperaturi ispod 25°C. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije Što neo-angin® kadulja pastile bez šećera sadrže?

Djelatne tvari:

Jedna pastila sadrži: 1,20 mg 2,4 diklorbenzilnog alkohola; 0,60 mg amilmetakrezola; 5,90 mg levomentola.

Pomoćne tvari:

eterično ulje paprene metvice, izomalt, tartaralna kiselina, eterično ulje kadulje, boja Ponceau 4R (E124), boja Quinoline Yellow (E104), boja Patent Blue V (E131).

Kako neo-angin® kadulja pastile bez šećera izgledaju i sadržaj pakiranja?

neo-angin® kadulja pastile bez šećera su boje meda, okrugle, blago bikonveksne, gotovo prozirne pastile.

24 (2x12) pastile u PVC/PVDC//Al blisteru.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač:

DIVAPHARMA GmbH

Motzener Strasse 41, 12277 Berlin

Njemačka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Clinres farmacija d.o.o.

Srebrnjak 61, 10000 Zagreb

Hrvatska

Telefon: 01/2396 900

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u travnju 2016.